

Preparo para a administração de medicamentos via sonda

Para evitar obstrução da sonda é muito importante seguir a técnica de preparo e os cuidados abaixo:

- Separe todo o material necessário (colher, seringa, recipiente de vidro, água e comprimidos que serão administrados pela sonda).



- Lave as mãos com água e sabão.



- Lave com água e sabão os recipientes de vidro e colher.
- Confira o nome e a dose do medicamento conforme receita médica.

Medicamentos sólidos (comprimido / cápsula)

- Retire o comprimido ou cápsula da embalagem.
- Coloque o medicamento dentro do recipiente de vidro.


- **Comprimido:** com a colher, amasse bem o comprimido com pancadas leves ou pressione até ficar em pó.



- **Cápsula:** apenas abra-a e coloque seu conteúdo dentro do recipiente de vidro.



- Coloque 20 mL de água fervida fria ou filtrada sobre o pó (do comprimido ou da cápsula).
- Com a ponta da seringa (sem agulha), misture bem a água e o pó com movimentos circulares.
- Puxe a mistura (água + pó do comprimido ou da cápsula) com a seringa (sem agulha).



Medicamentos líquidos (xarope, solução, suspensão oral)

- Os medicamentos de forma farmacêutica líquida não necessitam de preparo. Somente soluções muito espessas (grossas), como xaropes, devem ser diluídas de duas a três vezes. Por exemplo: se a quantidade de medicamento a ser administrada é de 5ml, deve-se adicionar mais 10ml ou 15ml de água no recipiente de vidro.

Administrando os medicamentos via sonda

- De preferência, deixe o paciente sentado, caso não seja possível mantenha a cabeceira da cama elevada.

- Antes da administração, a sonda deve ser lavada com 20ml de água filtrada ou fervida fria.

- Coloque a seringa na sonda e empurre o medicamento preparado, lentamente, até o final.



- Caso tenha mais de um medicamento para ser administrado no mesmo horário, utilize uma seringa para cada medicamento (cada um deve ser preparado e administrado separadamente). A sonda deve ser lavada com 5ml de água entre as administrações.
- Após a administração do último medicamento, finalize lavando a sonda com 20ml de água, para garantir que nenhum medicamento fique parado na sonda.

Atenção

- A água para lavagem da sonda e para a diluição do comprimido ou cápsula sempre deve ser fervida ou filtrada e utilizada em temperatura ambiente.
- Administre o medicamento através de seringa comum sem agulha.
- Mantenha o paciente sentado ou com a cabeceira da cama elevada por 30 minutos após a administração do último medicamento.
- Não misture na mesma seringa medicamentos diferentes.
- Nunca coloque medicamentos dentro do frasco com dieta.