



Educação
em Saúde

VOL. 115

PUBLICAÇÃO
AUTORIZADA



Orientações para
pacientes e familiares
sobre os cuidados com
**Cateteres para
Hemodiálise**

HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



O que você precisa saber:

O cateter é um dos acessos vasculares para realizar a hemodiálise. Ele pode ser temporário ou de longa permanência. Portanto alguns cuidados são fundamentais para preservá-lo, e você faz parte deste cuidado.

- É usado quando não há possibilidade de uso da fístula arteriovenosa (FAV).
- A escolha e colocação do cateter é um procedimento médico. É colocado em uma veia calibrosa na região do pescoço, tórax ou virilha. O cateter permite um fluxo de sangue adequado para realizar seu tratamento.
- Você ou seu familiar serão orientados sobre a colocação do cateter e informados sobre os cuidados necessários.

Tipos de cateter:

Curta permanência:

são chamados popularmente de Shilley®



Longa permanência:

são chamados popularmente de Permcath®



Cuidados importantes:

- O curativo deve ser mantido limpo, seco e fixado na pele para evitar que o cateter saia da veia.

- O curativo nunca pode ser molhado ou ficar úmido. Por isso, deve ser sempre protegido. Ao tomar banho você deve colocar uma proteção. Utilize plástico filme ou saco plástico.
- Caso o curativo molhe, por algum motivo (excesso de suor, sangramento, umidade no banho, ou outro) ele deve ser trocado o mais rápido possível pela equipe de saúde da sua clínica de hemodiálise.
- Não mexa no cateter, não retire a capa protetora e mantenha SEMPRE as tampinhas protetoras para evitar contaminação e sangramento.
- Não deite sobre o cateter para não dobrá-lo ou danificá-lo.
- Use roupas folgadas para evitar atrito com cateter.
- Ao vir para a sessão de hemodiálise, se o cateter estiver localizado na região do pescoço ou tórax, use roupas abertas na frente, com gola folgada para facilitar o manuseio do cateter pela equipe.
- Se o cateter estiver localizado na região da virilha, use uma calça folgada. **Se o cateter for de curta permanência evite sentar e caminhar**, pois isso poderá dobrar o cateter internamente danificando o cateter e a veia.
- Fique atento aos **sinais de infecção** como: **febre, dor, calor, inchaço e secreção no local do cateter**. Qualquer dúvida, entre em contato com a equipe de saúde da sua clínica de hemodiálise.
- Se por algum motivo o **cateter deslocar ou sair, deve ser imediatamente comprimido com gaze ou toalha limpa no local. Em seguida, você deve procurar o serviço de emergência para avaliação.**
- Se sangramento em grande quantidade entre em contato com sua clínica de hemodiálise para avaliação.

Lembre-se!

- O cuidado com seu cateter é fundamental. O funcionamento adequado é importante para realizar uma boa hemodiálise e melhorar a qualidade de vida.

Contatos:

Setor de hemodiálise:
(51) 3359-8121/3359-8885.

Quando comparecer ao atendimento tenha em mãos seu documento de identificação com foto.





Rua Ramiro Barcelos, 2350
Largo Eduardo Z. Faraco
Porto Alegre/RS 90035-903
Fone 51 3359 8000
www.hcpa.edu.br