



Educação
em Saúde

VOL. 69

PUBLICAÇÃO
AUTORIZADA



Uso de Filgrastima

Orientações ao paciente

HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS



Onde guardar o medicamento?

Guarde-o no refrigerador, mas lembrando que o medicamento não pode ficar na porta da geladeira nem ser congelado.

Mantenha o medicamento fora do alcance de crianças e protegido da luz.



Qual o material necessário para aplicação do medicamento?


- Algodão.
- Álcool 70%.
- Seringa de 1ml (insulina) com agulha.
- Frasco-ampola do medicamento (filgrastima).

Como administrar o medicamento?

Em caso de aplicação domiciliar, procure previamente orientação de um profissional de Enfermagem ou de seu médico e observe algumas normas básicas:

a) retire a filgrastima (frasco-ampola) pelo menos uma hora antes da aplicação para que atinja temperatura ambiente. NÃO USE fontes de calor como fogão ou micro-ondas, deixe que isto ocorra naturalmente;

- b) lave as mãos;
- c) organize todo material em local limpo;
- d) retire a tampa plástica do frasco do medicamento;
- e) passe algodão embebido em álcool 70% na borracha do frasco-ampola;
- f) introduza a seringa com a agulha na borracha do frasco;
- g) inverta o frasco-ampola e aspire o líquido conforme a dose prescrita;
- h) retire o ar da seringa;
- i) recape a agulha com cuidado;
- j) escolha o local de aplicação conforme desenho. As injeções devem ser aplicadas no subcutâneo (aplicar em baixo da pele, atrás do braço ou ao redor do umbigo). A dose será conforme prescrição médica.



- k) passe algodão embebido em álcool 70% na pele e introduza a agulha em ângulo reto;
- l) injete todo o líquido da seringa;
- m) retire a agulha com a seringa rapidamente da pele;
- n) pressione o local da aplicação com algodão embebido em álcool 70%;

o) faça rodízio nos locais da aplicação;

p) **NÃO USE ESTE MEDICAMENTO** se apresentar mudança de coloração, precipitado ou outra alteração.

O que fazer em caso de esquecimento de dose?

Caso você esqueça uma dose, aplique-a imediatamente no momento em que se der conta. Não dobre a dose do medicamento no próximo horário.

Fique alerta para os horários de administração, a fim de não esquecê-los, e confira sempre os rótulos dos medicamentos e as doses estabelecidas.

Ao aplicar o medicamento, você poderá sentir:

- Dor nos ossos, enjoo, perda de apetite ou outros sintomas. Se necessário, procure seu médico.

Uso de outros medicamentos

Não faça uso de outros medicamentos sem o conhecimento de seu médico ou orientação de um profissional de saúde. Isso pode ser perigoso para sua saúde!

A medicação será retirada na Farmácia de Programas Especiais (FAPE) localizada no 1º andar, mediante apresentação da prescrição médica.

Paciente de TMO: no dia da colocação do cateter, traga a dose do dia de filgrastima dentro de um isopor para fazer a aplicação no HCPA.

Em caso de dúvidas entre em contato pelo telefone (51) 3359.8269, em horário comercial.



HOSPITAL DE
CLÍNICAS
PORTO ALEGRE RS

SERVIÇO DE FARMÁCIA
GRUPO DE ENFERMAGEM

Rua Ramiro Barcelos, 2350
Largo Eduardo Z. Faraco
Porto Alegre/RS 90035-903
Fone (51) 3359.8000
Fax (51) 3359.8001
www.hcpa.edu.br